



CAMCEVI[®]
(leuprolide) 42 mg
injection emulsion



ESTÉ PREPARADO

INFÓRMESE SOBRE CÓMO
TRATAR SU CÁNCER DE
PRÓSTATA AVANZADO

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es CAMCEVI[®]?

CAMCEVI es una terapia de privación de andrógenos (TPA) que se usa para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de próstata avanzado.

No debe usar CAMCEVI si alguna vez tuvo una reacción alérgica a alguno de los ingredientes de CAMCEVI o a algún otro medicamento llamado agonista de la hormona liberadora de gonadotropina (gonadotropin-releasing hormone, GnRH).

Abra todo el folleto para ver la Información importante de seguridad completa.


CAMCEVI®
(leuprolide) 42 mg
injection emulsion



COMPRENDER SU PLAN

Independientemente de si vive con cáncer de próstata avanzado desde hace tiempo o si se lo han diagnosticado recientemente, es importante que sepa que existen opciones de tratamiento. Su proveedor de atención médica trabajará con usted en su plan de tratamiento, que ahora puede incluir CAMCEVI®.

¿QUÉ ES LA TERAPIA DE BLOQUEO HORMONAL CON AGONISTAS DE LA GnRH?

GnRH significa *hormona liberadora de gonadotropina*. Es un tipo de medicamento que impide que los testículos produzcan hormonas sexuales.¹

¿POR QUÉ REDUCIR SU TESTOSTERONA?

La testosterona es la hormona sexual masculina que se produce en los testículos. Esta “alimenta” al cáncer de próstata, lo que le permite crecer. La terapia hormonal impedirá que el cuerpo produzca testosterona o bloqueará lo que la testosterona hace en el cuerpo.²

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

CAMCEVI puede:


- Causar un aumento en su nivel de testosterona durante las primeras semanas de tratamiento, lo que puede provocar empeoramiento temporal de los síntomas o más signos y síntomas del cáncer de próstata. Puede experimentar un aumento temporal de dolor óseo. Puede tener problemas para orinar o presentar un nivel anormal de presión en la médula espinal, que puede provocarle parálisis y ser potencialmente mortal.
- Hacer que su azúcar en sangre aumente, lo que incluye un mayor riesgo de presentar diabetes. Se debe monitorear su azúcar en sangre mientras recibe CAMCEVI.
- Aumentar el riesgo de problemas cardíacos, incluido ataque al corazón, muerte súbita o accidente cerebrovascular. También puede hacer que el corazón tenga latidos irregulares.
- Hacer que algunos pacientes tengan convulsiones.

Abra todo el folleto para ver la Información importante de seguridad completa.

CÓMO ACTÚA

1

LA TESTOSTERONA ALIMENTA A LAS CÉLULAS CANCEROSAS



La mayor parte de la testosterona de un hombre se produce en los testículos. La testosterona fomenta el crecimiento de las células del cáncer de próstata.²

2

CAMCEVI® BLOQUEA LA PRODUCCIÓN DE TESTOSTERONA EN EL ORIGEN



CAMCEVI impide que los testículos produzcan testosterona. Esto dificulta el crecimiento del tumor.²

3

LOS NIVELES DE TESTOSTERONA DISMINUYEN³



Se espera que en aproximadamente 4 semanas, sus niveles de testosterona disminuyan a niveles muy bajos.³ Su proveedor de atención médica monitoreará sus niveles de testosterona para saber cómo está actuando CAMCEVI.

NOTA: Después de una primera inyección de CAMCEVI, los niveles de testosterona pueden aumentar durante un tiempo breve.³ Esto se conoce como *exacerbación* y es frecuente. Su proveedor de atención médica lo monitoreará durante todo el tratamiento para saber cómo está actuando CAMCEVI. Cuando se reducen los niveles de testosterona, los estudios muestran que permanecen bajos durante 6 meses.³ Luego, es el momento de otro tratamiento con CAMCEVI.

COMPRENDER LOS EFECTOS SECUNDARIOS

Los efectos secundarios pueden ser frecuentes con las terapias de bloqueo hormonal, como CAMCEVI. Es importante que sepa cuáles son los efectos secundarios frecuentes de CAMCEVI para que pueda hablar sobre ellos con su proveedor de atención médica. **Llame a su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.**

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

CAMCEVI puede:

- Causar daño fetal si se administra a una mujer embarazada.
- Causar impotencia y alterar la fertilidad en hombres con capacidad reproductora.

Abra todo el folleto para ver la Información importante de seguridad completa.

accord BioPharma

CAMCEVI, Accord BioPharma y los logotipos asociados son marcas comerciales de Accord BioPharma. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. ©2024 Accord BioPharma. Todos los derechos reservados. Este contenido está destinado únicamente al público de los Estados Unidos. PE-CAM-2300001 – 6/24


CAMCEVI®
(leuprolide) 42 mg
injection emulsion

LOS EFECTOS SECUNDARIOS MÁS FRECUENTES:

- Sofocos³
- Presión arterial alta³
- Reacción en el lugar de inyección, que puede causar ardor/escozor temporal, dolor, moretones o enrojecimiento³
- Infecciones de las vías respiratorias superiores³
- Dolor muscular y óseo³
- Cansancio³
- Dolor en las extremidades, como el cuello, los hombros, los brazos y las piernas³

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es CAMCEVI®?

CAMCEVI es una terapia de privación de andrógenos (TPA) que se usa para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de próstata avanzado.

No debe usar CAMCEVI si alguna vez tuvo una reacción alérgica a alguno de los ingredientes de CAMCEVI o a algún otro medicamento llamado agonista de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH).

CAMCEVI puede:

- Causar un aumento en su nivel de testosterona durante las primeras semanas de tratamiento, lo que puede provocar empeoramiento temporal de los síntomas o más signos y síntomas del cáncer de próstata. Puede experimentar un aumento temporal de dolor óseo. Puede tener problemas para orinar o presentar un nivel anormal de presión en la médula espinal, que puede provocarle parálisis y ser potencialmente mortal.
- Hacer que su azúcar en sangre aumente, lo que incluye un mayor riesgo de presentar diabetes. Se debe monitorear su azúcar en sangre mientras recibe CAMCEVI.
- Aumentar el riesgo de problemas cardíacos, incluido ataque al corazón, muerte súbita o accidente cerebrovascular. También puede hacer que el corazón tenga latidos irregulares.
- Hacer que algunos pacientes tengan convulsiones.
- Causar daño fetal si se administra a una mujer embarazada.
- Causar impotencia y alterar la fertilidad en hombres con capacidad reproductora.

Los efectos secundarios más frecuentes de CAMCEVI incluyen sofocos, presión arterial alta, reacción en el lugar de inyección, que puede causar ardor/escozor temporal, dolor, moretones o enrojecimiento, infecciones de las vías respiratorias superiores, dolor muscular y óseo, cansancio y dolor en las extremidades. Informe a su proveedor de atención médica si experimenta una erupción o una reacción grave en el lugar de inyección.

Para obtener más información, hable con su proveedor de atención médica.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMCEVI. Para obtener información adicional, consulte la información de prescripción completa o pregunte a su proveedor de atención médica o farmacéutico.

Le recomendamos informar los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) en el 1-800-FDA-1088 o visite www.fda.gov/medwatch.

ELEGIR SU TRATAMIENTO

Su proveedor de atención médica tiene varias opciones para tratar el cáncer de próstata avanzado. Hay muchas razones por las que CAMCEVI® podría ser adecuado para usted. Su proveedor de atención médica administrará CAMCEVI una vez cada 6 meses.



Las leuprolidas han demostrado ser eficaces en el tratamiento del cáncer de próstata avanzado.³



Hay una reducción de los niveles de testosterona hacia la semana 4 después de la dosis inicial.³



Hay una reducción constante de los niveles de testosterona desde la semana 4 hasta la semana 48. Hacia la semana 4, se espera que sus niveles de testosterona sean lo suficientemente bajos como para no promover el crecimiento del cáncer.³




Inyección subcutánea significa que la inyección se administra en el tejido adiposo, justo debajo de la piel.³

RECIBIR SU INYECCIÓN

Solo puede recibir las inyecciones de CAMCEVI de su proveedor de atención médica. Se inyecta la dosis adecuada en el tejido adiposo, justo debajo de la piel del abdomen.³ Mientras CAMCEVI le funcione, su proveedor de atención médica repetirá la inyección cada 6 meses.

Lugares de inyección



**INFÓRMESE SOBRE
QUÉ ESPERAR DURANTE
SU TRATAMIENTO.**



Visite **CAMCEVI.com**

Consulte la Información de prescripción completa que se adjunta.

RECURSOS PARA USTED

MÁS FORMAS DE CUIDAR

El programa **AccordCares™** les ofrece apoyo y recursos a usted, a sus seres queridos y a su proveedor de atención médica, incluida asistencia financiera y mucho más. Los servicios incluyen asistencia con los copagos, programas de cobertura alternativos y asistencia para su proveedor de atención médica a fin de garantizar que se verifique la cobertura elegible para su tratamiento.



Los pacientes que cumplan con los requisitos de elegibilidad pueden ser elegibles para recibir asistencia con los pagos. Descargue su formulario de inscripción en **accordcaresportal.com**.


COMUNÍQUESE CON ACCORDCARES

Teléfono: (866) 258-7151 | **Dirección:** PO Box 4485 Chesterfield, MO 63006
Fax: (855) 558-6304 | **Horarios:** de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este

VEA LA HISTORIA COMPLETA EN STORYMD

Infórmese más sobre los síntomas, las pruebas y los tratamientos para el cáncer de próstata, presentados en imágenes informativas que puede analizar con su proveedor de atención médica.

+STORYMD



Vea la historia completa en StoryMD.

Referencias:

1. National Cancer Institute. NCI Dictionaries. GnRH Agonist. Consultado el 14 de julio de 2022. <https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/gnrh-agonist>
2. NCCN Guidelines for Patients. Prostate Cancer Advanced Stage, 2020. Publicado en 2020. Consultado el 14 de julio de 2022. <https://www.nccn.org/patients/guidelines/content/PDF/prostate-advanced-patient.pdf>
3. CAMCEVI. Prescribing information. Accord BioPharma; mayo de 2021.